

Como fazer um teste à glucose com o MedCore Care



1. Lavar as mãos e secar muito bem.



2. Colocar a vareta de teste na abertura no topo do medidor e fechar a tampa imediatamente.



3. Desaparafusar a tampa da caneta de testes e colocar a lanceta incluída no saco do medidor; rodar a tampa da lanceta para a remover (proteção de esterilização), aparafusar novamente a tampa da caneta e rodar até obter a profundidade de penetração da agulha que pretende.



4. Aguardar até que apareça no visor uma gota a piscar e tirar uma amostra de sangue com a caneta de testes; limpar a primeira gota de sangue.



5. Colocar a extremidade da vareta de testes na gota de sangue e deixe que o sangue seja absorvido pela área do reagente.



6. O resultado é apresentado no visor após 6 segundos.

No caso de pretender guardar os resultados do teste como "antes da refeição/depois da refeição"



 Se pretende guardar os resultados com marcação de refeições, deve premir ▲ até aparecer uma maçã com dentadas como "depois da refeição",



2. ou premir ▲ novamente para não ser apresentada nenhuma das marcações acima e assim não marcar um resultado



- **3.** ou premir ▲ novamente até aparecer uma maça sem dentadas para marcar "antes da refeição"
- **4.** Premir 🖰 para confirmar. Remover a vareta de testes, e de seguida descartar no recipiente indicado. O último resultado fica quardado.



Como ir buscar um resultado à memória



1. Premir 🖰 durante cerca de 2-3 seg., (aparece "mem" no canto direito superior do visor) para ligar o medidor e o visor LCD acende-se com o último resultado de teste



Para voltar atrás na memória premir ▲.
 Premir ▼ para voltar.



3. Para visualizar os valores médios de 1 dia, 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias ou 90 dias, premir ⊕ e de seguida ▲, para ver estes resultados.



4. Premir 🖰 para voltar ao último resultado.





C Definir hora, data, hipo, hiper e alarme do MedCore Care


Func



1. Premir \bigcirc (*Ligar/Desligar*) até aparecer "FunC" no visor. A data e a hora ficam a piscar, para alterar premir \bigcirc mais uma vez

2. Com as setas ▲/▼(cima/baixo) é possível alterar o mês, dia, ano, hora e minutos, e com ⊕ navega para a frente no menu. Quandos todos os números de "data, hora" ficam novamente a piscar, premir ▲ para Ligar/Desligar o som. O medidor está ajustado em Ligado na entrega. [...]

3. Premir ▲ para aceder a ajustamento do som Ligar/Desligar. O medidor está ajustado em Ligado na entrega, premir em ⊕ para alterar com as setas ▲/▼ e premir ⊕ para confirmar



4. Premir ▲ para aceder ao ajustamento do valor de Hipoglicímia, ficando "Hypo" a piscar; na entrega o valor de hipoglicímia está definido para 2,8 mmol/L. Premir ტ para alterar com as setas ▲/▼, premir ф para confirmar.



5. Premir ▲ para aceder ao ajustamento do valor de Hiperglucose, ficando "Hyper" a piscar; na entrega o valor de hiperglucose está definido para 2,8 mmol/L. Premir ტ para alterar com as setas ▲/▼, premir ტ para confirmar.



6. Premir ▲ para aceder ao alarme onde encontra um relógio a piscar no visor; premir em ⊕ para o alarme nº. 1 para ajustar o alarme nº. 1



7. Premir ⊕ para alterar com ▲ para definir o alarme como Ligado/Desligado
Se selecionar Ligado, o tempo deve ser ajustado para quando pretende que o alarme seja emitido e apresentado, premir ⊕ e usar ▲/▼ para ajustar a hora, e premir ⊕ para confirmar; 1 fica a piscar



8. Premir ▲ para aceder ao alarme 2 e repetir a partir do ponto 6.

Premir em (b) durante 2-3 segundos para desligar o medidor ou este desliga-se depois de 2 minutos.

Por favor consultar o manual de utilização que é entregue com o medidor para mais informações.

Contactar o Serviço de Clientes da MedCore pelo tel: 08-631 08 30 ou Info@medcore.se

